

2.1 臨床特性

發現乳癌的模式

2,130宗乳癌個案中，有77.2%由患者自己發現，約13%經由乳癌篩檢方法發現，包括自我檢查乳房(0.4%)、由醫生作臨床檢查(3.3%)、乳房X光造影檢查(7.3%)、乳房超聲波檢查(2.1%)及磁力共振檢查(0.1%) (圖2.1.1)。

患者確診的年齡中位數為48.8歲。公立、私營及混合公私營醫療服務使用者三個組別的患者確診年齡中位數相若，三者分別為48.3歲、48.8歲及49.1歲。

在私營醫療機構接受治療的患者，經乳癌篩檢發現乳癌的個案比例，與混合使用公私營醫療服務組別的篩檢發現率相約；但較諸公立醫療服務使用者組別的篩檢發現率高出2.8%(表2.1.1)。

圖 2.1.1 患者初次發現乳癌的模式 (N=2,130)




表 2.1.1 按醫療服務類別分析初次發現乳癌的模式

	使用私營醫療服務組別 (N=492)	混合使用公私營醫療服務組別 (N=869)	使用公營醫療服務組別 (N=511)
自己發現	399 (81.1%)	665 (76.5%)	397 (77.7%)
自我檢查乳房	3 (0.6%)	2 (0.2%)	2 (0.4%)
由醫生作臨床檢查	12 (2.4%)	33 (3.8%)	16 (3.1%)
乳房X光造影檢查	36 (7.3%)	65 (7.5%)	25 (4.9%)
乳房超聲波	9 (1.8%)	20 (2.3%)	5 (1.0%)
磁力共振	1 (0.2%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)
資料不詳	32 (6.5%)	84 (9.7%)	65 (12.7%)

自己發現乳癌的主要徵狀

1,645名自己發現乳癌的個案中，絕大部分(89.4%)摸到無痛腫塊；4.4%感到痛楚；4.6%有其他乳房病變徵狀，例如乳頭內陷、有分泌物、皮膚破損及乳房不對稱。另有0.3%患者察覺到腋下淋巴結腫脹(圖2.1.2)。

不論在私營或公立醫療機構接受治療，患者均表示其主要徵狀為摸到無痛腫塊；私營醫療服務組別有88.8%，私營/公立醫療服務組別則有91.0%(表2.1.2)。

圖 2.1.2 自己發現乳癌的主要徵狀 (N=1,645)




表 2.1.2 按醫療服務類別分析乳癌患者自己發現乳癌的主要徵狀

主要乳癌徵狀	使用私營醫療服務 (N=400)	混合使用公私營醫療服務 (N=665)	使用公營醫療服務 (N=398)
無痛腫塊	355 (88.8%)	605 (91.0%)	359 (90.2%)
痛楚	19 (4.8%)	20 (3.1%)	23 (5.8%)
乳頭內陷/有分泌物	19 (4.8%)	29 (4.4%)	9 (2.3%)
腋下淋巴結腫脹	1 (0.2%)	2 (0.3%)	1 (0.2%)
皮膚破損	1 (0.2%)	3 (0.4%)	0 (0.0%)
乳房不對稱	1 (0.2%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)
其他	4 (1.0%)	3 (0.4%)	2 (0.5%)
資料不詳	0 (0.0%)	3 (0.4%)	3 (0.8%)

由出現徵狀至首次求醫相隔的時間

在2,130位患者中，42.9%在出現徵狀3個月內首次求醫，10.7%在4至12個月內求醫，5.4%在超過12個月後才求醫(圖2.1.3)。

三組在不同類別醫療機構接受治療的患者中，在私營機構接受治療的患者在3個月內求醫的比例最高(表2.1.3)。

圖 2.1.3 患者由初次發現病徵至初次求診相隔的時間 (N=2,130)




表 2.1.3 按醫療服務類別分析由發現病徵至首次求醫相隔的時間

時間	使用私營醫療服務 (N=492)	混合使用公私營醫療服務 (N=869)	使用公營醫療服務 (N=511)
< 1 月	201 (41.0%)	345 (39.7%)	177 (34.7%)
1-3月	158 (32.1%)	271 (31.2%)	166 (32.4%)
4-6月	51 (10.3%)	102 (11.7%)	67 (13.1%)
7-12月	34 (6.9%)	71 (8.2%)	53 (10.4%)
>12 月	48 (9.7%)	80 (9.2%)	48 (9.4%)