



圖表索引



表索引

	頁
表 1.1.1 乳癌患者的社會人口統計特徵(N=2,330)	87
表 1.2.1 確診前的飲食習慣、運動習慣及精神壓力狀況	89
表 1.2.2 按年齡組別分析確診前的飲食習慣、運動習慣及精神壓力狀況	89
表 1.2.3 按職業及年齡組別分析確診前的精神壓力水平	90
表 1.3.1 確診前的體重指數、胸圍尺寸及杯罩尺碼 (N=2,330)	91
表 1.3.2 確診前的乳癌家族病史、個人腫瘤及乳房疾病史	93
表 1.3.3 確診前的提前初經、延遲收經及生育紀錄	94
表 1.3.4 確診前使用外源荷爾蒙的狀況	95
表 1.3.5 患者共通的十大高危因素	97
表 1.4.1 兩個年齡組別的乳房檢查習慣比較	98
表 2.1.1 按醫療服務類別分析初次發現乳癌的模式	104
表 2.1.2 按醫療服務類別分析自己發現乳癌的主要徵狀	105
表 2.1.3 按醫療服務類別分析由發現病徵至首次求醫相隔的時間	106
表 2.2.1 乳房X光造影檢查、超聲波檢查和磁力共振檢查之敏感度和診斷結果	108
表 2.2.2 細針穿刺抽取檢查、粗針組織切片檢查及切除式切片檢查之敏感度及診斷結果	108
表 2.2.3 1,880名患者診斷乳癌分期的方法	110
表 2.2.4 按使用醫療服務類別分析確診時的乳癌分期	111
表 2.2.5 按使用醫療服務類別分析入侵性乳癌的腫瘤大小	111
表 2.2.6 按使用醫療服務類別分析乳癌入侵至淋巴結的數目	112
表 2.2.7 按使用醫療服務類別分析原位癌的腫瘤大小	113
表 2.3.1 入侵性乳癌個案的組織學分類、級別、腫瘤多灶性及腫瘤多中心性(N=1,853)	114
表 2.3.2 入侵性乳癌的分子學特性	115
表 2.3.3 入侵性乳癌個案的雌激素受體、黃體素受體及第二型類表皮生長因子受體的分子學子類別(N=1,853)	115
表 2.3.4 原位癌的組織學分類、級別、腫瘤多灶性及多中心性	116
表 2.3.5 原位癌的分子學特性	116
表 2.4.1 乳癌手術的種類	110
表 2.4.2 按使用醫療服務類別環類藥物、紫杉醇類藥物及其他藥物的使用情況	123
表 2.4.3 患者接受電療的部位 (N=1,381)	124
表 2.4.4 按乳癌期數分析各醫療服務組別使用三苯氧胺比率	125
表 2.4.5 按乳癌期數分析各醫療服務組別使用芬香環轉化酶的比率	125
表 2.5.1 跟進訪問1,630名患者的結果	128
表 2.5.2 乳癌死亡個案的特性	128
表 3.2.1 乳癌對1,444名患者的心理及生活影響	135
表 3.2.2 為克服乳癌而作出的心理及生活調節方法	138

圖索引

	頁
圖 1.1.1 乳癌病人之年齡分佈(N=2,330)	87
圖 1.2.1 按年齡組別分析確診前患者的吸煙及飲酒習慣	88
圖 1.3.1 按年齡組別分析確診前的體重指數	92
圖 1.3.2 按年齡組別分析確診前服用口服避孕藥的情況	95
圖 1.3.3 按年齡組別分析確診前使用荷爾蒙補充劑的情況	96
圖 1.3.4 確診前患者擁有的高危因素數目	97
圖 1.4.1 按教育程度分析確診前自我檢查乳房習慣	99
圖 1.4.2 按教育程度分析確診前由醫生臨床檢查的習慣	99
圖 1.4.3 按教育程度分析確診前進行乳房X光造影檢查的習慣	100
圖 1.4.4 按教育程度分析確診前進行乳房超聲波檢查的習慣	100
圖 2.1.1 患者初次發現乳癌的模式(N=2,130)	104
圖 2.1.2 自己發現乳癌的主要徵狀 (N=1,645)	105
圖 2.1.3 患者由初次發現病徵至初次求診相隔的時間(N=2,130)	106
圖 2.2.1 患者兩側乳房的發病位置(N=2,130)	107
圖 2.2.2 乳癌在乳房的位置(N=2,130)	107
圖 2.2.3 患者進行診斷性乳房X光造影檢查的結果(N=1,886)	109
圖 2.2.4 進行診斷性乳房X光造影的患者乳房密度(N=1,886)	109
圖 2.2.5 乳癌患者確診時之癌症分期 (N=2,130)	110
圖 2.2.6 入侵性乳癌個案的腫瘤大小	111
圖 2.2.7 入侵性乳癌患者的陽性淋巴結數目	112
圖 2.2.8 原位癌的腫瘤大小分佈(N=233)	113
圖 2.3.1 原位癌患者的乳房X光造影檢查結果(N=241)	117
圖 2.4.1 按年齡組別分析手術類別	119
圖 2.4.2 按乳癌症期數分析手術類別	119
圖 2.4.3 按醫療服務類別分析患者接受的手術種類	120
圖 2.4.4 較年輕患者及較年老患者之乳房重建方式比較	120
圖 2.4.5 不同醫療服務使用者之乳房重建比率	121
圖 2.4.6 按醫療服務類別分析患者的乳房重建方式	121
圖 2.4.7 按乳癌期數分析患者進行的淋巴結節手術種類	122
圖 2.4.8 不同乳癌期數患者接受化療的比率	122
圖 2.4.9 入侵性乳癌患者使用的化療藥物種類	123
圖 2.4.10 按乳癌期數分析患者使用化療藥物的種類	123
圖 2.4.11 按乳癌期數分析患者使用內分泌治療的比率	124
圖 2.4.12 原位癌及入侵性乳癌患者使用內分泌治療的方式	125
圖 2.4.13 按乳癌期數分析入侵性乳癌患者接受針對性治療的比率	126
圖 2.4.14 入侵性乳癌患者使用針對性治療藥物的類別	126
圖 2.4.15 患者使用的輔助及另類治療類別(N=275)	127
圖 3.1.1 接受手術後身體不適的程度	131
圖 3.1.2 不同乳房手術後身體不適的程度	131
圖 3.1.3 接受電療後身體不適的程度	132
圖 3.1.4 接受化療後身體不適的程度	132
圖 3.1.5 使用不同化療藥物後患者身體不適程度	133
圖 3.1.6 接受內分泌治療後身體不適的程度	133
圖 3.1.7 接受針對性治療後身體不適的程度	134



圖3.1.8	接受輔助及另類治療後身體不適的程度	134
圖3.2.1	按年齡組別分析患者人生觀的的轉變	136
圖3.2.2	按乳癌期數分析患者人生觀的的轉變	136
圖3.2.3	按年齡組別分析患者自我形象的轉變	137
圖3.2.4	按乳癌期數分析患者自我形象的轉變	137
圖3.2.5	按年齡組別分析患者對復發的憂慮程度	139
圖3.2.6	按乳癌期數分析患者對復發的憂慮程度	139