

表索引

		頁
表I	本報告書內不同章節所用作分析的患者數目	15
表1.1	香港婦女罹患乳癌的一生累積風險（2010至2015年的平均數據）	83
表1.2	確診前的飲食習慣、運動習慣及精神壓力水平（人數 = 16,743）	86
表1.3	確診前的體重指數（人數 = 16,743）	87
表1.4	確診前的家族乳癌病歷（人數 = 16,743）	87
表1.5	確診前的個人腫瘤病歷（人數 = 16,743）	87
表1.6	患者曾患惡性腫瘤的身體部位（人數 = 283）	88
表1.7	確診前的乳房狀況或疾病病歷	88
表1.8	確診前初經、收經及生育紀錄	89
表1.9	受訪群組的生育次數（人數 = 12,735）	90
表1.10	確診前使用荷爾蒙避孕劑的情況（人數 = 16,743）	90
表1.11	已收經患者在確診前使用荷爾蒙補充劑的情況（人數 = 8,735）	90
表1.12	受訪群組罹患乳癌十大高危因素（人數 = 16,743）	91
表1.13	按年齡組別分析檢查乳房的習慣	92
表1.14	按教育程度分析檢查乳房的習慣	93
表1.15	按每月家庭收入分析檢查乳房的習慣	94
表1.16	按居住地區分析檢查乳房的習慣	95
表2.1	按醫療服務種類分析最初發現乳癌的方式（人數 = 15,673）	101
表2.2	按癌症種類分析最初發現乳癌的方式（人數 = 15,663）	102
表2.3	按癌症期數分析最初發現乳癌的方式（人數 = 15,146）	102
表2.4	無意中發現乳癌的患者出現症狀至首次求醫相隔的時間（人數 = 3,423）	103
表2.5	按醫療服務種類分析無意中發現乳癌的患者出現症狀至首次求醫相隔的時間（人數 = 3,423）	103
表2.6	無意中發現乳癌的患者出現症狀至首次求醫相隔的時間與癌症期數的關係（人數 = 3,000）	104
表2.7	乳房影像檢驗的敏感度及診斷結果（人數 = 16,595）	105
表2.8	以乳房X光造影檢查確診的患者檢查結果（人數 = 11,788）	106
表2.9	按年齡組別分析以乳房X光造影檢查確診的患者乳房密度（人數 = 8,183）	106

	頁
表2.10 乳癌活組織檢測的敏感度及診斷結果 (人數 = 16,595)	107
表2.11 7,016名入侵性乳癌患者檢定乳癌期數的方法	108
表2.12 不同期數患者使用正電子掃描作檢定乳癌期數的方法 (人數 = 7,016)	108
表2.13 入侵性乳癌的組織學分類、級別、腫瘤的多灶性及多中心性 (人數 = 14,234)	111
表2.14 入侵性乳癌的生物學特性 (人數 = 14,234)	112
表2.15 按癌症期數分析入侵性腫瘤的生物學亞型 (人數 = 13,355)	113
表2.16 原位癌個案的組織學分類、級別、腫瘤的多灶性及多中心性 (人數 = 2,194)	114
表2.17 原位癌個案的生物學特性 (人數 = 2,194)	114
表2.18 手術的種類 (人數 = 16,583)	116
表2.19 輔助性局部區域性放射性治療對周邊淋巴結覆蓋程度 (人數 = 6,478)	120
表2.20 以確診時年齡及癌症期數分析接受化療的比率 (人數 = 13,242)	121
表2.21 不同癌症期數患者接受的治療數目 (人數 = 15,654)	128
表2.22 跟進訪問14,699名患者的結果	129
表2.23 按手術種類及癌症期數分析局部區域性復發的個案數目	130
表2.24 出現局部區域性復發的位置 (人數 = 388)	130
表2.25 遠端擴散影響的器官 (人數 = 494)	131
表2.26 按不同癌症期數分析入侵性乳癌患者的局部區域性和遠端復發率	131
表2.27 乳癌死亡個案的特性 (人數 = 181)	132
表3.1 手術後五種最常見的身體不適 (人數 = 14,681)	135
表3.2 放射性治療後五種最常見的身體不適 (人數 = 8,769)	136
表3.3 化療後五種最常見的身體不適 (人數 = 8,954)	136
表3.4 內分泌治療後五種最常見的身體不適 (人數 = 9,452)	137
表3.5 抗第二型人類上皮生長素受體靶向治療後五種最常見的身體不適 (人數 = 1,810)	137
表3.6 乳癌為患者帶來的心理影響	139
表3.7 為存活而作出的心理和生活調節及應對策略	140



圖索引

		頁
圖I	香港乳癌資料庫參加者的確診年份分佈	12
圖II	香港乳癌資料庫報告的患者來源分佈	15
圖1.1	確診年齡的分佈 (人數 = 16,743)	83
圖1.2	受訪群組的職業 (人數 = 16,743)	83
圖1.3	受訪群組的教育水平 (人數 = 16,743)	84
圖1.4	受訪群組的每月家庭收入 (港幣) (人數 = 9,487)	84
圖1.5	受訪群組的居住地區分佈 (人數 = 16,743)	84
圖1.6	受訪群組的胸圍尺碼 (人數 = 16,743)	85
圖1.7	受訪群組的胸圍罩杯大小 (人數 = 16,743)	85
圖1.8	患者確診前擁有的乳癌高危因素數目分佈 (人數 = 16,743)	91
圖2.1	受訪群組最初發現乳癌的方式 (人數 = 15,673)	101
圖2.2	患者自己無意中發現乳癌的主要症狀 (人數 = 13,055)	102
圖2.3	16,595名患者乳癌的發病位置	104
圖2.4	乳癌的位置 (人數 = 16,595)	105
圖2.5	以乳房X光造影檢查確診的患者乳房密度 (人數 = 8,463)	106
圖2.6	確診時的癌症期數 (人數 = 16,595)	109
圖2.7	入侵性乳癌個案的腫瘤大小 (厘米) 分佈 (人數 = 12,213)	109
圖2.8	入侵性乳癌個案的腋下淋巴結狀態 (人數 = 13,904)	110
圖2.9	原位乳癌個案的腫瘤大小 (厘米) 分佈 (人數 = 1,781)	110
圖2.10	按年齡組別分析手術類型 (人數 = 15,597)	117
圖2.11	按腫瘤大小分析手術類型 (人數 = 13,965)	117
圖2.12	按癌症期數分析手術類型 (人數 = 15,766)	117
圖2.13	按患者接受治療的醫療服務種類分析手術類型 (人數 = 15,668)	117
圖2.14	按臨床淋巴結狀況分析淋巴結手術的種類 (人數 = 15,172)	118
圖2.15	按癌症期數分析入侵性乳癌患者淋巴結手術的種類 (人數 = 13,376)	118
圖2.16	淋巴結呈陰性或陽性的入侵性腫瘤大小分佈 (人數 = 12,147)	118

	頁
圖2.17 按淋巴結手術類型分析陽性淋巴結數目 (人數 = 15,118)	119
圖2.18 曾接受乳房保留手術及局部區域性放射性治療患者在不同癌症期數的比率 (人數 = 5,606)	120
圖2.19 曾接受乳房切除手術及局部區域性放射性治療患者在不同癌症期數的比率 (人數 = 9,871)	120
圖2.20 按癌症期數分析患者接受化療的比率 (人數 = 13,732)	121
圖2.21 按乳癌生物學亞型分析患者在手術前的前置化療使用的藥物種類 (人數 = 939)	122
圖2.22 按乳癌生物學亞型分析患者在術後輔助性化療使用的藥物種類 (人數 = 7,172)	123
圖2.23 按癌症期數分析患者在術後輔助性化療使用的藥物種類 (人數 = 7,314)	124
圖2.24 按乳癌生物學亞型分析患者在舒緩性化療使用的藥物種類 (人數 = 289)	125
圖2.25 不同癌症期數患者接受內分泌治療的比率 (人數 = 15,829)	126
圖2.26 按年齡組別分析患者使用內分泌治療的藥物 (人數 = 10,095)	126
圖2.27 按癌症期數分析第二型人類上皮生長素受體呈陽性患者接受靶向治療的比率 (人數 = 2,944)	127
圖2.28 6,378名患者使用輔助及另類治療法的種類	128
圖3.1 手術後感到身體不適的程度 (人數 = 14,681)	135
圖3.2 按手術類型分析身體不適的程度 (人數 = 14,646)	135
圖3.3 放射性治療後身體不適的程度 (人數 = 8,769)	136
圖3.4 按不同部位接受放射性治療分析身體不適的程度 (人數 = 5,998)	136
圖3.5 化療後身體不適的程度 (人數 = 8,954)	136
圖3.6 內分泌治療後身體不適的程度 (人數 = 9,452)	137
圖3.7 抗第二型人類上皮生長素受體靶向治療後身體不適的程度 (人數 = 1,810)	137
圖3.8 輔助性及另類治療法後身體不適的程度 (人數 = 6,378)	138
圖3.9 按年齡組別分析人生觀的轉變 (人數 = 14,114)	139
圖3.10 按年齡組別分析自我形象的轉變 (人數 = 14,114)	140
圖3.11 按年齡組別分析患者憂慮復發的程度 (人數 = 14,150)	140