

有關乳癌患者接種新冠肺炎疫苗事宜

最近香港乳癌基金會收到乳癌患者查詢有關治療及康復期間接種新冠肺炎疫苗的注意事項。基金會就上述查詢向 2019 冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會詢問有關情況，其後獲回覆並收到現時已獲批於香港使用的新冠疫苗的資訊。

以下為上述資訊的連結，供大家詳閱。

CoronaVac 克爾來福（科興）接種須知 https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_CHI.pdf	Comirnaty 「復必泰」接種須知 https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_CHI.pdf
---	--

對於正接受治療的乳癌患者

有人擔心部分癌症的治療（如化療、電療及免疫治療）會影響免疫系統，以致減低接種新冠疫苗的效果。其實至目前為止，仍未有研究探討新冠疫苗對免疫系統受抑制的人士有何作用。

乳癌患者在接種疫苗前，如有疑問，應先諮詢主診醫生意見，並因應自身情況，考慮接種疫苗的效益及風險。

對於患有淋巴水腫的乳癌患者及康復者

美國癌症協會（American Cancer Society）指出，部分人士接種新冠疫苗後，注射疫苗一邊的手臂下淋巴結可能出現腫脹或壓痛。此情況通常屬免疫系統的正常反應，以為身體作好對抗新冠肺炎感染的準備。

美國癌症協會建議，現時或曾經患上乳癌的人士應避免於罹患乳癌的同一邊手臂接種疫苗。例如，如該人士的左邊乳房曾患上乳癌，應考慮於右邊手臂接種疫苗。

參考資料（只有英文）：

<https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/low-blood-counts/infections/covid-19-vaccines-in-people-with-cancer.html>

對於希望接受乳房 X 光造影檢查的婦女

國外有報告指出，注射疫苗後出現的淋巴結腫脹有被誤認作乳癌症狀的可能。

美國乳房影像學會（The Society of Breast Imaging）建議：「如身體狀況許可，且不會耽誤護理，接受乳房 X 光造影檢查的時間應盡量安排於注射第一劑新冠疫苗之前，或在注射第二劑疫苗後四至六星期後。

參考資料 (只有英文) :

美國乳房影像學會有關接種新冠疫苗前後進行乳房造影檢查的指引 (English Only)

<https://www.sbi-online.org/Portals/0/Position%20Statements/2021/SBI-recommendations-for-managing-axillary-adenopathy-post-COVID-vaccination.pdf>

附加資料

除以上資料外，乳癌患者及康復者亦可參考以下國外有關疫苗之醫學研究及指引：

National Comprehensive Cancer Network's COVID-19 Resources for the Cancer Care Community (只有英文)

<https://www.nccn.org/covid-19/>

European Society for Medical Oncology's Statements on COVID-19 Vaccination in Cancer Patients (只有英文)

<https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination>

Macmillan Cancer Support (只有英文)

<https://www.macmillan.org.uk/coronavirus/vaccine>